

## 青森県にてチャバネセセリを採集

三橋 渡

305-0031 茨城県つくば市吾妻 1-603-223

### First record of *Pelopidas mathias* (Fabricius) (Lepidoptera, HesperIIDae) from Aomori Prefecture, Japan

Wataru MITSUHASHI

Azuma 1-603-223, Tsukuba, Ibaraki, 305-0031 Japan

**Abstract** *Pelopidas mathias* (Fabricius) is recorded from Aomori Prefecture for the first time. This is the northernmost capture of this species in Japan, and at a location distant from the previously known record.

**Key words** *Pelopidas mathias*, HesperIIDae, Aomori Prefecture, distribution.

チャバネセセリ, *Pelopidas mathias* (Fabricius) の採集・目撃記録は、北東北（青森県、秋田県、岩手県）以北の日本国内では岩手県宮古市での一頭の記録（岩手虫の会、1988）のみと思われる。筆者は2000年8月に青森県にて本種を採集したので報告する。

1♂ (Fig. 1), 青森県青森市稲山, 4. VIII. 2000, 筆者採集・標本保管。

稲山（狭義の「稲山」）山頂直下のマツの比較的多い雑木林内で、筆者の前方数メートルの林床から飛び出し、林床付近を数メートル飛翔して林床の草に止まったところを採集したものである。本種は日当たりの良い環境を好むが、本個体の見られた林床の地点が林内では比較的明るい環境であったかということについては現在記憶が定かではない。鮮度は普通である。本種が青森県で採集されたことは、近年日本列島で観察されている数種のチョウの北上現象の原因と推測されている地球温暖化に起因する可能性がありそうで、今後東北地方中部・北部、特に北部では本種に注意する必要があるかも知れない。




Fig. 1. A male *Pelopidas mathias* found for the first time in Aomori Prefecture, Japan. A: Upperside. B: Underside.

## 引用文献

岩手虫の会, 1988. 岩手の蝶. 180 pp. 熊谷印刷出版部, 盛岡.

## Summary

A single male of *Pelopidas mathias* (Fabricius) was caught on August 4, 2000, at Inayama, Aomori-shi, Aomori Prefecture, Japan. This is the first record from this prefecture and is the northernmost capture of this species in Japan. In the northern part of the Tohoku district, this skipper was formerly known only by a sole record at Miyako-shi, Iwate Prefecture.

(Accepted September 12, 2000)